



## よくある問い合わせ (FAQ)

Q: 混合軟膏の処方入力方法がわからないのですが?

A: 下記の画面の通りに入力してください (必ず同一 Rp 内に入力)

① 1 剤目の軟膏を入力後、用量を入力後に mix の頭文字「m」を入力。

「混用」にチェックが付きます!


② 2 剤目を入力し、用法を選択。

RP	薬剤名	使用量	単位	指示	別記
Rp.01	保険自動設定				<input checked="" type="checkbox"/> 混用
1	アズノール軟膏(3,000倍) 20g/本	20	g	通常	
2	亜鉛華(10%)単軟膏	20	g	通常	
	1日1回				

★注意★ フリーコメント欄へ「混合」と入力してもオーダが認識しませんので、必ず上記の方法で入力してください。ご協力をお願いします。

## Staff Interview

薬剤師 林 えり子



こんにちは。働き始めて 2 年目の駆け出しの薬剤師です。私も DI News の編集に携わることになりましたので、皆さんに有益だと思って頂ける情報を発信していけるように頑張ります。今年度からは NST の一員としても活動させて頂くことになり、様々な職種の方々とのコミュニケーションを大切にしながらチーム医療に貢献したいと思っております。

編集委員: 長田 貴之、林 えり子、水口 貴史、大崎 由美子、川岸 亨、笠師 久美子

ご意見、ご感想をお待ちしています kusuri@med.hokudai.ac.jp

## トピックス

### 制吐剤「イメンドカプセル」について

イメンドは選択的ニューロキニン 1 (NK1) 受容体拮抗という、新しい作用機序を持った制吐剤です。がん化学療法で、従来の制吐剤では抑えることが出来なかった強度の嘔気・嘔吐に優れた効果があるとされます。アメリカでは既に化学療法レジメンに積極的に取り込まれており、本院でも今後使用頻度が増えていくものと予想されます。

#### <用法用量>

- 1 日目: 化学療法の 60 ~ 90 分前に 125 mg を内服
- 2, 3 日目: 午前中に 80 mg を内服

#### <服薬のポイント>

- 大きめのカプセルです。簡易懸濁は出来ません。125 mg は 1 号カプセル、80 mg は 2 号カプセルです。カプセルの中には顆粒 (ゴマ粒程の大きさ) が入っています。微温湯で溶かすのに 30 分以上かかります。
- 1 シート 3 日分セットになっています。1 日目の 125 mg カプセルと、2, 3 日目の 80 mg カプセルを間違えないようご注意ください。
- デカドロンなど、ステロイドの代謝を遅らせます。(フェニトインなどの代謝も遅らせます)
- 数日間作用が持続します。
- 比較的高価な薬です。(1 シート 11,707.8 円)



～ 詳細は近くの薬剤師または医薬品情報室までご連絡ください～